





PREPARACIÓN DE COLON CON CASENGLICOL (CN 722207)

3 DÍAS ANTES	DIETA POBRE EN RESIDUOS
Arroz y pastas, caldos, carne y pescado a la plancha o hervido, quesos duros, galletas sin fibra, pan tostado, zumos filtrados, infusiones, té, café y bebidas sin burbujas.	
	
NO PUEDE TOMAR	Ensaladas, verduras y legumbres, fruta, patatas, carnes y pescados en salsa, embutidos, leche, grasas, pasteles y bebidas con gas.
24 HORAS ANTES	DIETA LÍQUIDA
Agua, caldos filtrados, zumos colados, infusiones, té, café y bebidas sin burbujas.	
	

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE CASENGLICOL

El día anterior a la exploración / intervención:

A las 18:00 horas, diluir 1 sobre de **Casenglicol** en un litro de agua. Beber la solución despacio a razón de un vaso grande (250 ml) cada 20 minutos. Repetir el proceso hasta terminar los 4 sobres o hasta que las deposiciones sean líquidas y transparentes.





Las primeras deposiciones comenzarán a los 30-60 minutos de haber iniciado la toma del preparado.

OBSERVACIONES:

- El día de la prueba deberá estar en ayunas **seis horas, antes de la exploración** (no tomará agua, ni líquidos, no fumará ni mascarará chicles).
- Los siete días anteriores a la prueba no debe tomar **aspirina, ni antiinflamatorios, ni medicación que contenga hierro**.
- Si toma algún tipo de **anticoagulante** (Sintrom), consulte con su médico.
- Debe seguir tomando los tratamientos que normalmente hace para otras patologías.
- Se recomienda venir acompañado/a y no conducir tras la prueba.
- Consulte con su médico la necesidad de un estudio preoperatorio.



PREPARACIÓ DEL COLON AMB CASENGLICOL (CN 722207)

3 DIAS ABANS	DIETA POBRE EN RESIDUS
Arròs i pastes, brous, carn i peix a la planxa o bullit, formatges durs, galetes sense fibra, torrades, suc filtrats, infusions, te, cafè i begudes sense gas.	
	
NO POT PRENDRE	Amanides, verdures i llegums, fruita, patates, carn i peix amb salsa, embotits, llet, greixos, pastissos i begudes amb gas.
24 HORES ABANS	DIETA LÍQUIDA
Aigua, brous filtrats, suc passats pel colador, infusions, té, cafè i begudes sense gas.	
	

INSTRUCCIONS PER A LA INGESTA DE CASENGLICOL

El dia anterior a l'exploració:

A les 18:00 hores, disoldre 1 sobre de **Casenglicol** en un litre d'aigua. Beure la solució a poc a poc a raó d'un got gran (250 ml) cada 20 minuts. Repetir el procés fins acabar els 4 sobres o fins que les deposicions siguin líquides i clares.



Les primeres deposicions començaran els 30-60 minuts d'haver iniciat la ingesta del preparat.

OBSERVACIONS:

- **El dia de la prova** haurà d'estar en dejú **6 hores, abans de l'exploració** (no beurà aigua, ni líquids, ni menjarà xiclets, ni fumarà).
- Els set dies anteriors a la prova no ha de prendre **aspirina, antiinflamatoris, ni derivats de ferro**.
- Si està prenent **anticoagulants** (Sintrom), consulti amb el seu metge.
- Ha de seguir prenent els tractaments habituals per a altres patologies.
- Es recomana venir acompanyat i no conduir després de la prova.
- Consulti amb el seu metge la necessitat d'un estudi preoperatori.